



QUELAGEN FIERRO (Fe)

Aporte correctivo de hierro quelatado
Mejor absorción, translocación y asimilación

Fertilizante Uso Foliar y Suelo

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona hierro (Fe). Este producto tiene una rápida acción y eficacia en la planta. El Fe es necesario en la clorofila.

Beneficios relevantes de las aplicaciones en post cosecha

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Quelagen Premium y toda la línea InnoAgrok.

Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

La corrección de la deficiencia de hierro no es fácil, esta puede conseguirse con aplicaciones consecutivas hasta que los síntomas en la hojas nuevas desaparezcan.

Composición

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	0,5	0,55
Silicio (SiO ₂)	0,75	0,8
Hierro (Fe)	5,0	5,5
pH (dilución al 10%)	4,5	4,5
Densidad (a 20 °C)	1,1	1,1
Solubilidad (a 20 ° C)	100 %	100 %

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276

Recomendaciones generales

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Avellano Europeo y Nogal	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	4-6	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Kiwi	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Arándano, frutilla y frambueso	4-6	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Palto	4-6	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Manzano y Peral	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.
Olivo	4	Según síntomas visuales, cada 7 días.

Cultivo y Hortalizas	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Aji, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	2	Durante el ciclo del cultivo hasta que síntomas desaparezcan
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	2	Durante el ciclo del cultivo hasta que síntomas desaparezcan
Cereales, Papa y otros Cultivos	2	Durante el ciclo del cultivo hasta que síntomas desaparezcan

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276