



QUELAGEN COBRE (Cu)

Cobre pentahidratado de acción
translaminar en los tejidos foliares,
fruta y madera.

Uso Foliar y Raíz-Suelo

Es una formulación líquida (SL) que contiene una base de Carbono Orgánico y silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona cobre. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de prevención y control en la planta y en la fruta.

Beneficios relevantes de las aplicaciones:

Se recomienda en especies frutales y cultivos hortícolas.

El silicio ayuda a obtener un epidermis de mayor firmeza y elasticidad fruta. Acción preventiva

Aplicación foliar y raíz.

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos hortícolas. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersion en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Vía suelo-raíz, aplicar en el entorno del tronco en una pequeña taza para su localización.

Composición

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	3,0	3,9
Silicio (SiO ₂)	4,5	5,8
Cobre (Cu)	5,0	5,7
pH (dilución al 10%)	4,5	4,5
Densidad (a 20 °C)	1,3	1,3
Solubilidd (a 20 ° C)	100 %	100 %

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276

Recomendaciones generales, uso foliar, 2-3 aplicaciones según condición.

Frutales	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	1-2	Apartir de botón floral y cada 15 días según condición.
Avellano Europeo y Nogal	3	Apartir de botón floral y cada 15 días según condición.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	1-2	A partir de brotación y cada 15 días según condición.
Kiwi	1-2	A partir de brotación y cada 15 días según condición.
Arándano, frutilla y frambueso.	1,0	A partir de brotación y cada 15 días según condición.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1-2	Apartir de botón floral y cada 15 días según condición.
Palto	1,5-2	Apartir de botón floral y cada 15 días según condición.
Manzano y Peral	1-2	Apartir de botón floral y cada 15 días según condición.
Olivo	2-3	A partir de brotación y cada 15 días según condición.

Cultivo y Hortalizas	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	0,25-0,75	Durante el desarrollo, según condición ambiental
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	0,25-0,75	Durante el desarrollo, según condición ambiental
Cereales, Papa y otros Cultivos	0,25-0,75	Durante el desarrollo, según condición ambiental

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile
Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile
Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276