



# QUELAGEN CALCIO (Ca)

**Aporte complementario de Calcio y  
condición final de la fruta.**

Quelato de calcio de mejor absorción, translocación y asimilación.

## Fertilizante Uso Foliar

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona calcio de alta translocación y asimilación. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de respuesta de entrada del calcio a la fruta.

## Beneficios relevantes de las aplicaciones en post cosecha

El silicio tiene beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Quelagen potasio, Selefrut y toda la línea InnoAgrok.

## Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

## Composición

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	0,5	0,6
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	0,7	0,8
Calcio (CaO)	11,0	12,0
pH (dilución al 10%)	6,5	5,5
Densidad (a 20 °C)	1,1	1,1
Solubilidad (a 20° C)	100,0	100,0

## InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276



**Innoagrok**

Nutrición foliar y de la raíz

**Recomendaciones generales, uso foliar, 2-3 aplicaciones durante la maduración.**

<b>Frutales</b>	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Avellano Europeo y Nogal	4	Post cuaja, cada 7 días
Vid de Mesa y Vid Vinificación	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Kiwi	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Arándano, frutilla y frambueso	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Palto	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Manzano y Peral	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Olivo	4	Post cuaja, cada 7 días

<b>Cultivo y Hortalizas</b>	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	4	Post cuaja, cada 7 días
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	4	40 y 30 días antes de cosecha.
Cereales, Papa y otros Cultivos	4	40 y 30 días antes de cosecha.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276

