



QUELAGEN BORO (B)

Aporte correctivo de boro. Mejor absorción, translocación y asimilación.

Uso Foliar y Suelo

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona Boro (B). Este producto tiene una rápida acción y eficacia en la planta. El B es necesario en las yemas florales, también en la floración, tubo polínico y cuaja. En tejidos de reserva.

Beneficios relevantes de las aplicaciones:

En botón floral y en floración

Nutrir los tejidos florales, tubo polínico y cuaja.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Foligen, Selefrut, Quelagen Zn y toda la línea InnoAgrok.

En post Cosecha en especies frutales

Mejorar las Reservas de boro en las yemas y madera cercana.

Puede ser mezclado con Reseryem, Selefrut, Quelagen Zn.

Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersion en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56078670288, +56982495278, +56982495276

Composición

Caracterización Nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono Orgánico Total	0,5	0,55
Silicio (SiO ₂)	0,75	0,8
Boro (B ₂ O ₃)	-	14,2
pH (disolución al 10%)	6,5	5,5
Densidad (a 20° C)	1,1	1,1
Solubilidad (a 20° C)	100	100

Recomendaciones generales

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	1-2	Botón floral y hasta floración.
Avellano Europeo y Nogal.	1-2	Desde inflorescencia hasta floración.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	1-2	Antes y hasta plena flor.
Kiwi	0,75	Antes y hasta plena flor.
Arándano, frutilla y frambueso.	1-2	Botón floral y hasta floración.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1-2	Botón floral y hasta floración.
Palto	1-2	Desde inflorescencia hasta floración.
Manzano y Peral	1-2	Botón floral y hasta floración.
Olivo	2	Desde inflorescencia hasta floración.

Cultivo y Hortalizas	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	1	En floración
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	1	En floración
Cereales, Papa y otros Cultivos	1	En floración

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56078670288, +56982495278, +56982495276