



QUELAGEN CINC_(Zn)

**Aporte correctivo de zinc.
Quelato de Zn de mejor absorción,
translocación y asimilación**

Fertilizante Uso Foliar y Suelo

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona Cinc (Zn). Este producto tiene una rápida acción y eficacia de Activación y Respuesta en la planta. El Zn es necesario para la síntesis endógena del aminoácido triptófano y síntesis endógena de auxinas.

Beneficios relevantes de las aplicaciones en post cosecha

El silicio tiene el beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Quelagen Potasio, Selefrut y con toda la línea InnoAgrok.

Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersion en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Evite aplicar con fruta cuajada; el cinc (Zn) puede dañar la fruta en su epidermis.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276

Composición

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	0,5	0,55
Silicio (SiO ₂)	0,75	0,8
Cinc (Zn)	5,0	5,5
pH (dilución al 10%)	3,5	5,5
Densidad (a 20 °C)	1,1	1,1
Solubilidad (a 20° C)	100,0	100,0

Recomendaciones generales, fraccionar la dosis anual, evitar su aplicación poscuaaja.

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Avellano Europeo y Nogal	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	1-2	Antes y plena floración.
Kiwi	1-2	Antes de floración.
Arándano, frutilla y frambueso	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1-3	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Palto	2-3	En panícula y hasta inicio de caída de pétalos.
Manzano y Peral	1,0-2,0	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Olivo	3	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.

Cultivo y Hortalizas	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	1	En primavera.
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	1	En primavera.
Cereales y otros Cultivos	1	En primavera.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile
 Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile
 Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276