



QUELAGEN POTASIO (K)

**Aporte complementario de Potasio.
Ayuda en el llenado carbohidratos,
maduración, color de la fruta.**

Quelato de potasio de mejor absorción, translocación y asimilación.

Fertilizante Uso Foliar

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de carbono orgánico y de silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona potasio de alta translocación y asimilación. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de Activación y Respuesta en el proceso de maduración y término de la fruta.

Beneficios relevantes de las aplicaciones en post cosecha

El silicio tiene el beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Mejor acopio y translocación de carbohidratos y disponibilidad de antocianinas.

Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Selefrut y toda la línea InnoAgrok.

Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos.

Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276



Composición

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	0,5	0,6
Silicio (SiO ₂)	0,7	0,8
Potasio (K ₂ O)	12,0	13,0
pH (dilución al 10%)	6,5	6,5
Densidad (a 20 °C)	1,1	1,1
Solubilidad (a 20° C)	100,0	100,0

Recomendaciones generales, uso foliar, 2-3 aplicaciones durante la maduración.

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Avellano Europeo, Nogal	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Vid de Mesa, Vid Vinificación	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Kiwi	6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Arándano, frutilla y frambueso.	4-5	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Palto	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Manzano y Peral	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Olivo	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.

Cultivo y Hortalizas	Dosis anual Lt/Ha	Epocas de aplicación
----------------------	----------------------	----------------------

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276



Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	6	Durante la maduración, cada 5 días
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	4	Durante la maduración, cada 5 días
Cereales, Papa y otros Cultivos	2	Durante la maduración, cada 5 días

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276

