



# FOSFICUR

**Fosfito de potasio 40/20**  
**Potasio y Fósforo de mejor absorción,**  
**translocación y asimilación.**

## **Fertilizante Uso Foliar y Raíz-Suelo**

Es una formulación líquida (SL). Este producto tiene una rápida acción y eficacia a través de la síntesis de fitoalexinas en la planta.

### **Beneficios relevantes:**

- Inductor de resistencia sistémica adquirida (RSA) y síntesis de fitoalexinas.
- Se recomienda en especies frutales y cultivos hortícolas.
- Puede ser mezclado con MKC-2500

### **Aplicación foliar y raíz.**

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos hortícolas. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersion en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Puede ser aplicado vía suelo-raíz, aplicar en el entorno del tronco en una pequeña taza para su localización. Vía suelo duplique la dosis indicada en la tabla de recomendaciones.

### **Composición**

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40,0	54,0
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20,0	27,0
pH (dilución al 10%)	6,0	5,5
Densidad (a 20 °C)	1,35	1,35
Solubilidad (a 20° C)	100,0	100,0

### **InnoAgrok S.A.**

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile  
Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile  
Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276



## Recomendaciones generales

Vía foliar : 2-3 aplicaciones, cada 7 días

<b>Frutales</b>	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	2	Desde inicio de brotación, cada 15 días.
Avellano Europeo y Nogal.	2	Desde inicio de brotación, cada 15 días.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Kiwi	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Arándano, frutilla y frambueso.	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Palto	3	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Manzano y Peral	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.
Olivo	2	Desde inicio de brotación cada 15 días.

<b>Cultivos y Hortalizas</b>	Dosis Lt/Ha	Epocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	1-2	Desde trasplante.
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	1-2	Desde trasplante.
Cereales, Papa y otros Cultivos	1-2	Desde emergencia.

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +562 23679773 +56982495278, +56982495276

